

fizjoterapia polska

POLISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY

OFICJALNE PISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

THE OFFICIAL JOURNAL OF THE POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY



NR 1/2019 (19) KWARTALNIK ISSN 1642-0136

**Ocena wpływu kompleksowej terapii
uzdrowiskowej z zastosowaniem
wód leczniczych radoczących
na poziom hemoglobiny –
badania wstępne**

**Assessment of the influence
of comprehensive spa therapy
with therapeutic radon waters
on hemoglobin levels: preliminary study**


**Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii
The problem of difficult to heal wounds and pressure ulcers in physiotherapy**

ZAMÓW PRENUMERATĘ!

SUBSCRIBE!

www.fizjoterapiapolska.pl

prenumerata@fizjoterapiapolska.pl



Dr. Comfort®



APROBATA
AMERYKAŃSKIEGO
MEDYCZNEGO
STOWARZYSZENIA
PODIATRYCZNEGO



WYRÓB
MEDYCZNY

Nowy wymiar wygody dla stóp z problemami

**Obuwie profilaktyczno-zdrowotne
o atrakcyjnym wzornictwie
i modnym wyglądzie**

**Stabilny, wzmocniony
i wyściełany zapętek**

*Zapewnia silniejsze
wsparcie łuku
podłużnego stopy*

**Miękki, wyściełany
kołnierz cholewki**

*Minimalizuje
podrażnienia*

Wyściełany język

*Zmniejsza tarcie i ulepsza
dopasowanie*

Lekka konstrukcja

*Zmniejsza codzienne
zmęczenie*

**Antypoślizgowa,
wytrzymała
podeszwa o lekkiej
konstrukcji**

*Zwiększa przyczepność,
amortyzuje i odciąża stopy*

**Wysoka jakość materiałów - naturalne
skóry, oddychające siatki i Lycra**

*Dostosowują się do stopy, utrzymują
je w suchości i zapobiegają przegrzewaniu*

**Ochronna przestrzeń
na palce - brak szwów
w rejonie przodostopia**

Minimalizuje możliwość zranień

**Zwiększona
szerokość
i głębokość
w obrębie palców
i przodostopia**

*Minimalizuje ucisk
i zapobiega urazom*

Trzy
rozmiary
szerokości

Podwyższona
tęgość

Zwiększona
przestrzeń
na palce

WSKAZANIA

• haluksy • wkładki specjalistyczne • palce młotkowate, szponiaste • cukrzyca (stopa cukrzycowa) • reumatoidalne zapalenie stawów • bóle pięty i podeszwy stopy (zapalenie rozciągniętej podeszwy - ostroga piętowa) • płaskostopie (stopa poprzecznie płaska) • bóle pleców • wysokie podbicie • praca stojąca • nerwiak Mortona • obrzęk limfatyczny • opatrunki • ortezy i bandaż • obrzęki • modzele • protezy • odciski • urazy wpływające na ścięgna, mięśnie i kości (np. ścięgno Achillesa) • wrastające paznokcie

Wyłączny dystrybutor w Polsce:



ul. Wilczak 3
61-623 Poznań
tel. 61 828 06 86
fax. 61 828 06 87
kom. 601 640 223, 601 647 877
e-mail: kalmed@kalmed.com.pl
www.kalmed.com.pl



www.butydlazdrowia.pl

www.dr-comfort.pl

CRYO-T ELEPHANT


 Polski produkt. Serwis i produkcja w Polsce.

Zaawansowany aparat do kriostymulacji miejscowej dla fizjoterapeutów, ośrodków SPA oraz gabinetów medycyny estetycznej.

- Czujnik temperatury skóry zapobiegający przemrożeniom
- Laserowy wskaźnik optymalnej odległości głowicy
- Jedyne na rynku nieprzemarzający przewód kriogeniczny
- Duży wybór pojemności zbiorników na ciekły azot
- Wskaźnik poziomu azotu



Polecamy również aparaty na dwutlenek węgla.
Sprawdź na: www.metrum.com.pl



ULTRASONOGRAFY DLA FIZJOTERAPEUTÓW I ORTOPEDÓW

CHCESZ MIEĆ W GABINECIE?

- najlepszy, przenośny ultrasonograf b/w na świecie
- nowoczesne 128-elem. głowice
- 3 lata gwarancji
- dobrą cenę

CHCESZ MIEĆ?

- szybką i trafną diagnozę narządu ruchu i skutecznie dobrane leczenie
- sonofeedback w leczeniu schorzeń i rehabilitacji pod kontrolą USG
- wyselekcjonowanie pacjentów już na pierwszej wizycie (rehabilitacja czy skierowanie do szpitala)

CHCESZ IŚĆ

na profesjonalne szkolenie dla fizjoterapeutów kupując USG?

CHCESZ MIEĆ super warunki leasingu i uproszczoną procedurę przy zakupie USG?

**NIE CZEKAJ, AŻ INNI CIĘ WYPRZEDZĄ!
JUŻ PONAD 300 FIZJOTERAPEUTÓW
NAM ZAUFALO**

HONDA 2200

- Najlepszy, przenośny ultrasonograf b/w na świecie.
- Najczęściej kupowany przez fizjoterapeutów.
- Krystalicznie czysty obraz.
- 3 lata gwarancji.
- Sondy 128-elem.



**Przy zakupie USG
Profesjonalne
szkolenie
GRATIS!**



Made in Japan

Atrakcyjne warunki leasingu!

03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 67/16
tel. 22 / 855 52 60, fax 22 / 855 52 61, kom. 695 980 190

 **polrentgen®**

www.polrentgen.pl

KOORDYNACJA

Medyczna Strona Technologii

PRODUCENT

DYSTRYBUTOR

NEUROREHABILITACJA

KINEZYTERAPIA

FIZYKOTERAPIA

DIAGNOSTYKA

PODOLOGIA



660-404-464

INFO@KOORDYNACJA.COM.PL

WWW.KOORDYNACJA.COM.PL

nowy wymiar magnetoterapii



seria aparatów
PhysioMG
rozbudowane funkcje
i poszerzone możliwości



producent nowoczesnej
aparatury fizykoterapeutycznej

ASTAR.fizjotechnologia®

ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 33 829 24 40, fax +48 33 829 24 41

www.astar.eu

wsparcie merytoryczne
www.fizjotechnologia.com

NIEZBĘDNE W FIZJOTERAPII



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW


TAŚMY, DYSKI, PIŁKI, KINESIOLOGY TAPE

PRZYROST SIŁY MIĘŚNIOWEJ
STABILIZACJA STAWOWA
MOBILIZACJA I ODCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA

Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej

Unikalne w skali światowej opracowanie wymienionych w tytule tematów. Księga pod redakcją prof. Ireny Ponikowskiej składa się z dwóch tomów, zawiera łącznie 59 rozdziałów opracowanych przez 62 znamienitych autorów, w tekście zamieszczono dużo kolorowych zdjęć, rycin i tabel. Starannie wydana, okładki w okleinie imitującej oprawę materiałową w kolorze burgunda.

www.wielkaksiegalbalneologii.pl



Acta Balneologica

jest naukowym czasopismem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
Ukazuje się od 1905 roku.

Na łamach kwartalnika publikowane są recenzowane prace z zakresu medycyny uzdrowiskowej – balneologii, bioklimatologii, balneochemii, hydrogeologii i medycyny fizykalnej – fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii, a także rehabilitacji.

Czasopismo indeksowane w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science.



www.actabalneologica.pl

Prenumerata roczna kosztuje 100 zł.
Koszty wysyłki na terenie kraju wliczone w cenę prenumeraty.
Ceny zawierają 5% VAT.

Zamówienia prenumeraty i książek oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl

Wydawnictwo ALUNA, Z.M.Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 245 10 55 w godz. 9-15.

INDYWIDUALNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

PODIATECH

SIDAS MEDICAL



TERMOFORMOWALNE WKŁADKI SIDAS TO:

- 100%-owe dopasowanie do stopy;
- szybkość wykonania (około godziny);
- szerokie zastosowanie: wkładki ortopedyczne dla stóp z patologiami, wkładki sportowe oraz wkładki komfortowe (także do czółenek i butów wizytowych);
- wysoka jakość i trwałość.

OFERUJEMY:

- kompleksowe wyposażenie gabinetów do diagnostyki stóp i postawy ciała pacjenta;
- urządzenia do wykonywania indywidualnych wkładek ortopedycznych;
- szeroką gamę wysokiej jakości gotowych baz wkładek oraz materiałów technicznych;
- doradztwo i wsparcie na każdym etapie rozwoju gabinetu;
- specjalistyczne szkolenia prowadzone przez międzynarodowych ekspertów Sidas.



Skontaktuj się z nami!

Tel.: 603 289 589

E-mail: sidasmedical@windsport.pl

www.sidas.pl



CQ Elektronik System





Nowoczesna diagnostyka

Terapia rehabilitacyjna

www.cq.com.pl

ZESTAW APARATURY DO LABORATORIUM KOMPUTEROWEJ DIAGNOSTYKI I KOREKCJI POSTAWY CIAŁA



SYSTEM MORA 4G





Fotogrametria przestrzenna 3D
Druga kamera całosylwetkowa

Platformy CQ-Stab2P

stabilograficzne i DYNAMOMETRYCZNE
jedno i DWUPLYTOWE
do badania wyskoku dla SPORTOWCÓW



CQ-Stopy3D CAD-CNC



Bezpośrednie skanowanie przestrzenne (3D) stóp
System komputerowego wykonywania indywidualnych wkładek
Dokładna diagnostyka stóp i koślawości/szpotałości kolan i pięt

KOMPUTEROWE FREZOWANIE WKŁADEK
NA MIEJSCU, NA MIARĘ, NA CZAS!

PROJEKTUJEMY RÓWNIEŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
W OFERCIE · KOMPUTEROWE BADANIE POSTAWY · RUCHU · TREMORU · SIŁY · BALANSU · TRENINGU

Polski PRODUCENT * ul. Wiśniowa 15 * Czernica * tel. (71) 3180104 * (601) 794162

gymna.PRO



innowacyjność - funkcjonalność - design

NOWE TRENDY



Stała pozycja pacjenta


Ergomax
maksymalny komfort i higiena



System „One-Click”
jednoczesna regulacja podłokietników



„One-Click” jednoczesna
regulacja podłokietników



Pakiet LED

System bezpieczeństwa SDM
automatyczne wykrywanie ruchu



Pamięć ustawień wysokości

elecpol

ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań, 61 825 60 50, biuro@elecpol.pl, www.elecpol.pl

URZĄDZENIA DO REHABILITACJI, KRIOTERAPII, KINEZYTERAPII, FIZYKOTERAPII, HYDROTERAPII



Urządzenie do krioterapii miejscowej

KRIOPOL R

Zastosowanie: rehabilitacja • medycyna sportowa • odnowa biologiczna

Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania powierzchni ciała pacjenta przy pomocy par azotu, które u wylotu dyszy osiągają temperaturę **-160°C**

EFEKTY KRIOTERAPII:

- zmniejszenie bólu
- zwiększenie zakresu ruchomości stawów
- wzrost masy mięśniowej
- zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego
- ograniczenie stosowania leków przeciwzapalnych
- redukcja cellulitu

**Umożliwiamy bezpłatne
testowanie urządzenia**
tel. 502 502 444

kriomedpol

KRIOMEDPOL Sp. z o.o.
ul. Warszawska 272 05-082 Stare Babice
tel. 22 733 19 05 tel./faks 22 752 93 21

www.kriomedpol.pl kriomedpol@kriomedpol.pl





TROMED TRAINING

program szkoleniowy

Diagnostyka
i leczenie manualne
w dysfunkcjach
stawu kolanowego

Mobilność i
stabilność -
profilaktyka
urazów
w treningu
sportowym
i fizjoterapii

Współczesne
metody leczenia
wybranych dysfunkcji
stawu skokowego
i stopy

Schorzenia
narządów
ruchu
u dzieci
i młodzieży

Mózgowe Porażenie
Dziecięce -
algorytm postępowania
diagnostyczno-
terapeutycznego

Rehabilitacja
Kardiologiczna
w praktyce

Podstawy
neurorehabilitacji
- udar mózgu

Dysfagia -
zaburzenia
połykania
w pracy
z pacjentem
neurologicznym

Podstawy
neuromobilizacji
nerwów obwodowych -
diagnostyka i
praktyczne zastosowanie
w fizjoterapii

Wybrane elementy
zaopatrzenia
ortopedycznego
w praktyce

Terapia
pacjentów
z obrzękiem
limfatycznym

Fizjoterapia
w
onkologii

Zaopatrzenie
dla osób
po urazie
rdzenia kręgowego

Zaopatrzenie
dla osób
po
udarze mózgu

Skuteczna
komunikacja z pacjentem
i jego otoczeniem


Narzędzia
coachigowe
w pracy
z pacjentem

Trening
diagnostyczno-
rozwojowy
personelu medycznego



Informacje
i zapisy

TROMED Zaopatrzenie Medyczne
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4 (wejście Rzgowska 169/171)
tel. 42 684 32 02, 501 893 590
e-mail: szkolenia@tromed.pl
www.szkolenia.tromed.pl



Darmowy kompleksowy program dla gabinetu fizjoterapeutycznego

- ✓ Wielofunkcyjny kalendarz
- ✓ Kartoteka pacjentów
- ✓ Kody ICD-9, ICD-10, ICF
- ✓ Kreator formularzy - testy
- ✓ Dedykowana karta wizyty
- ✓ Rejestracja pacjentów online 24/7
- ✓ Powiadomienia SMS
- ✓ Aplikacje mobilne (iOS, Android)

- ✓ Testuj wszystkie funkcje **14 dni za darmo**
 - ✓ **Medfile Free** - dla małego gabinetu
 - ✓ **Medfile Plus** - licencja roczna już od 990zł **590 zł**
- Kod promocyjny: ptf03**

Umów się
na prezentację:

Anna Baron

✉ abaron@medfile.pl

☎ 731 030 629

Wpływ płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie stawów kolanowych i kręgosłupa u dzieci

The influence of static splayfoot on body posture within knee joints and spine in children

扁平足对儿童膝关节和脊椎姿势缺陷发生的影响

**Katarzyna Bogacz^{1,3(C,D,F)}, Bartosz Pańczyszak^{1(B,C,E)}, Daria Duch^{1(B,A)},
Jacek Łuniewski^{3,5(D,E)}, Marcin Krajczyk^{3,4(C,F)}, Jan Szczegielniak^{1,2,3(A,D)}**

¹Szpital Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku / Vital Medic Hospital in Kluczbork, Poland

²Szpital Specjalistyczny MSWiA w Gliucholazach / SP ZOZ MSWiA Hospital in Gliucholazy, Poland

³Instytut Fizjoterapii, Politechnika Opolska / Physiotherapy Department, Opole University of Technology

⁴Szpital Miejski w Nysie / Health Care Centre of Nysa City Hospital, Nysa, Poland

⁵Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup / Stobrowskie Medical Center in Kup

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena postawy ciała uczniów szkół podstawowych oraz ocena wpływu płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa.

Materiał i metodyka badań

Materiał badawczy stanowiło 306 dzieci klas IV uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kluczbork. Badania przeprowadzono na przełomie 2017 i 2018 roku. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej w celu zbadania zależności pomiędzy poszczególnymi wadami postawy ciała. Zastosowano analizę korelacji dla określenia związków pomiędzy ocenianymi zmiennymi.

Wyniki. Analiza występowania błędów postawy w całej przebadanej populacji wykazała zmienne istotne statystycznie dla bocznego skrzywienia kręgosłupa, stopy płaskiej oraz koślawości kolan. Dodatkowo u jednego dziecka zaobserwowano przykurcz zgięciowy stawów kolanowych.

Wnioski

1. Wady postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa są powszechne u czwartoklasistów.
2. Istnieje istotny związek pomiędzy płaskostopiem a wadami postawy w obrębie kolan i kręgosłupa.

Słowa kluczowe:

Płaskostopie, wady postawy, dzieci, zdrowie

Abstract

Aim of work. The aim of this work was to assess body postures of primary school pupils and to assess the influence of static splayfoot on bad posture within lower limbs and spine.

Material and Methods. Research sample included 306 grade four pupils attending primary schools in Kluczbork municipal district. The research test were conducted at the turn of 2017 and 2018. The results gathered in the test were subjected to statistical analysis to determine correlations between particular body posture deformities. Correlation analysis was used to determine correlations between the assessed variables.

Results. The analysis of posture fault occurrence in the research population showed variables of statistical significance for spine curvatures, flat foot and cross knees. Additionally, knee joints flexion contracture was reported in one child.

Conclusions.

1. Bad body posture within lower limbs and spine are common among grade four pupils.
2. There is a strong correlation between splayfoot and deformities within knees and spine.

Key words:

Splayfoot, body posture, children, health

摘要

研究目的。研究目的为评估小学生的身体姿势，并评估扁平足对下肢和脊椎姿势缺陷发生的影响。

材料及研究方法。研究材料包括 306 名克卢奇堡市小学四年级的学生，该研究于 2017 及 2018 年间进行，针对所获得的研究结果进行统计分析，以调查特定身体姿势缺陷间的依赖性，相关分析用于确定评估变量之间的关系。

结果。对受试人群的姿势错误发生的分析显示脊椎侧弯、扁平足及膝外翻上的统计学显著变量。此外，有一名儿童膝关节弯曲挛缩。

结论

1. 下肢及脊椎的姿势缺陷在四年级学生中为普遍现象。
2. 扁平足和膝盖及脊椎姿势缺陷间有重要关系。

关键词：

扁平足、姿势缺陷、儿童、健康

Introduction

Body posture is one of the indicators of man's development. Its assessment allows to determine muscle tone within individual elements of human body. Any changes in the structure of the skeletal system as well as dysfunctions of spatial body shape should be defined as bad posture [1]. In recent studies, various research reports, published in both Polish and English, agree that approximately 70% of examined children present bad body posture [2, 3, 4]. Deformities within upper and lower limbs directly related to spine constitute 45-55% of all faulty postures [5].

At present, there are numerous methods and criteria for body posture assessment. The quickest method involves visual assessment of the position of individual elements of the body in relation to others. Not only is this method quick but it can also be carried out by parents themselves provided they have been given adequate instructions. Visual assessment of lower limbs and spine allows to observe a few faults in body posture at the same time.

Splayfoot is one of the most common foot deformities. At school age, it might not cause pain, however, not addressed, it may affect the positioning of other body elements [6].

A foot with a low or falling longitudinal arch may result from musculoligamentous system's deficiency.

Cross knees are bone deformities (femur or tibia curvature, knee joint hypertrophy) and musculoligamentous deformities which lead to predisposition for patellar dislocation. A child standing with their knees together (knees not tight or overlapping) is not able to bring feet together. The distance over 5cm between medial part of the ankles is indicative of a deformity.

Sideway curve of the spine, termed as scoliosis, is a multi-plane deformity. The deviation presents in the following planes:

- a) coronal plane – spine is curved sideways, to the left or to the right;
- b) sagittal plane – anterior or backward curvature deepens (lordosis or kyphosis);
- c) transverse plane – vertebrae rotate and lead to formation of a hunchback.

Visual assessment of body posture might indicate scoliosis by e.g. presence of rib prominence, asymmetric position of scapulae, obliquely positioned pelvis.

Aim of work

The aim of this work was to assess body postures of primary school pupils and to assess the influence of static splayfoot on bad posture within lower limbs and spine.

Material and Methods

Research sample included 306 grade four pupils attending primary schools in Kluczbork municipal district. The research test were conducted at the turn of 2017 and 2018. Parents' or carers' written consents were collected before the research.

The research was conducted in Vital Medic Hospital Spine Center in Kluczbork. The assessment procedure used the author's own body posture assessment card based on the scoring method by Kasperczyk [1]. The test included the following:

- in the coronal plane (front): upright standing posture, shoulder position, waist triangles position, pelvis position, knee position;
- in the coronal plane (back): upright standing posture, scapulae position, rib prominence assessment, foot arches;
- in the sagittal plane: head position, shoulder position, scapulae position, ribcage, abdomen, thoracic kyphosis, lumbar lordosis.

In the test, points were awarded depending on the degree of the deformation of the assessed element: 0 pts – norm, 1 pt – minor deformity, 2 pts – major deformity, 3 pts – severe posture deformity. Total points awarded in the test allowed to recommend corrective exercises if necessary. The assessment card additionally included test for teenagers' body mass index (BMI) and overall characteristics of body posture.

The results gathered in the test were subjected to statistical analysis to determine correlations between particular body posture deformities. Correlation analysis was used to determine correlations between the assessed variables. Statistical significance level for the tests was established at $p < 0.05$. The complete analysis with the use of statistical analysis package was carried out with the Excel spreadsheet with Solver and Statistica software.

Results

The analysis of posture fault occurrence in the research population (Tab. 1) showed variables of statistical significance for spine curvatures, flat foot and cross knees. Additionally, knee joints flexion contracture was reported in one child.

Table 1 Detailed numbers of body posture deformities in the research population

Age (years)	Weight (kg)
Sideway curve of the spine	131
Concave back	42
Round back	17
Flat back	28
Round-concave back	17
Splayfoot	122
Flat-cross foot	61
Varus knee	8
Cross knee	40
Contracture knee	1

Within spine, scoliosis was reported in 56% of all assessed deformities. To illustrate significance of the observed differences, percentage distribution of spine deformities was presented (Fig. 1).




Fig. 1. Percentage of spine deformities within research population

Within feet, static splayfoot was reported in 67% of all assessed deformities. Other children with foot deformities presented flat-cross foot. To illustrate significance of the observed differences, percentage distribution of feet deformities was presented (Fig. 2).




Fig. 2. Percentage of foot deformities within research population

Within knees, cross knee was reported in 82% of all assessed deformities. To illustrate significance of the observed differences, percentage distribution of knee deformities was presented (Fig. 3).




Fig. 3. Percentage of knee deformities within research population

Identification of bad posture cases within research population allowed to establish whether lateral spine deformities correlate with splayfoot formation or cross knees problem leads to splayfoot formation (Tab. 2)

Table 2. Correlations between body posture deformities

	Sideway curve of the spine	Concave back	Round back	Flat back	Round- concave back	Splayfoot	Flat-cross foot	Varus knee	Cross knee	Contracture knee
Sideway curve of the spine		0.059	0.081	0.343	0.264	0.789	0.478	0.351	0.645	0.123
Concave back	0.059		0.245	0.045	0.478	0.367	0.456	0.647	0.231	0.065
Round back	0.081	0.245		0.358	0.457	0.441	0.421	0.221	0.411	0.345
Flat back	0.343	0.045	0.358		0.243	0.412	0.356	0.341	0.221	0.341
Round- concave back	0.264	0.478	0.457	0.243		0.341	0.213	0.332	0.421	0.323
Splayfoot	0.789	0.367	0.441	0.412	0.341		0.214	0.113	0.689	0.241
Flat-cross foot	0.478	0.456	0.421	0.356	0.213	0.214		0.412	0.433	0.216
Varus knee	0.351	0.647	0.221	0.341	0.332	0.113	0.412		0.213	0.227
Cross knee	0.645	0.231	0.411	0.221	0.421	0.689	0.433	0.213		0.443
Contractur e knee	0.123	0.065	0.345	0.341	0.323	0.241	0.216	0.227	0.443	

Discussion

The method of visual assessment of body posture based on the assessment card designed by the authors seems to be a quick and simple to apply way to analyze children's posture. The test does not require financial resources or specialist equipment and can be used for screening purposes. Test results reliably recorded in the assessment card allow to monitor a child's posture over time periods.

The analysis conducted in this research aimed to identify correlations between particular bad body postures assessed by the research authors. The comparison of gathered results and the results published by other authors showed the correlation between cross knee and splayfoot in children [7].

Scoliosis observed in 56% of the children in this research was a predominant spine deformity. This dominance has been confirmed by numerous authors, though the percentage of children affected by lateral spine curvature varies. Janiszewska et. al. [8] report 73.9% of scoliosis cases in collated results. The research by Brackzowska et. al. [9] into health problems of secondary school students shows that scoliosis prevails (83.3%) among dysfunctions defined as musculoskeletal system deformities and diseases. What seems interesting and not yet fully explained is the statistical significance of the correlation between scoliosis and cross knees or splayfoot in children. Frequent cases of splayfoot in children is related to the age of this population as this is when feet grow and shape [10].

Not fully developed musculoligamentous system within the foot might cause falling of the transverse arch, pull the knee and predispose it to cross. The hypothesis about this correlation seems justified because the percentage of bad posture within lower limbs and feet is smaller in more physically active children. On the other hand, children with higher body mass index present more cases of cross knees [11].

The correlation between scoliosis and lower limbs deformities has not been fully explained. People with lateral spine curvations are characterized by more severe dysfunctions of body statics [12]. Biomechanical analyses [13] show that maintaining proper tone of postural muscles, including trunk muscles, depends on the proper function of lower limbs' muscles. As we already know, they are not properly balanced in case of bad body posture.

It is difficult to decide, however, which dysfunction appears first and can be considered primary. It would require insightful observation of the development of musculoskeletal system among children predisposed to such dysfunctions and frequent comparison of gathered results.

To summarize the observations collected in this research, it can be stated that lower limb and spine dysfunctions are common among grade four pupils. Their etiology is not clear. It is also not clear how they correlate or which is the primary one. Bad posture correlations between lower limbs and spine might suggest that it is crucial to involve children in regular physical activity and regularly monitor their body posture. Insidious health incidents might affect the positioning of other body parts. Assessment and prophylaxis must not be neglected.

Conclusions

1. Bad body posture within lower limbs and spine are common among grade four pupils.
2. There is a strong correlation between splayfoot and deformities within knees and spine.

Adres do korespondencji / Corresponding author

Katarzyna Bogacz

Szpital Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku
e-mail: k.bogacz@vitalmedic.pl

Piśmiennictwo/ References

1. Kołodziej J, Kołodziej J. i wsp. Postawa ciała jej wady i korekcja. Wydawnictwo oświatowe FOSZE 2008.
2. Maciałyk-Paprocka K, Krzyżaniak A, Kotwicki T. i wsp. Występowanie błędów w postawie ciała u uczniów poznańskich szkół podstawowych. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 309-314
3. Kleszyk K, Sobera M., Kuc K. Aktywność fizyczna dzieci w wieku 9–10 lat, a wady postawy w obrębie tułowia. Rozprawy naukowa AWF we Wrocławiu 2017; 58: 12–21
4. Mieszkowska M., Kochanowicz M., Garbin M. i wsp.: Charakterystyka postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym regionu bydgoskiego. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(8):637-652
5. Górecki A, Kiwerski J, Kowalski IM. i wsp. Profilaktyka wad postawy i dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów. Pol Ann Med. 2009; 16: 168-177
6. Kłoda M. Brzuszkiewicz – Kuźmicka G. Drajczyk M. i wsp. Częstość występowania wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym I. Fizjoterapia Polska 2016;16(1);36-46.
7. Trzcńska D. Olszewska E. Wiśniewski A i wsp. Ukształtowanie kolan i wysklepienie stóp u chorych z zespołem Turnera. Pediatric endocrinology 2011; 17;3:138-144
8. Janiszewska R. Tuzinek S. Nowak S i wsp. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6- 12 letnich – uczniów szkół podstawowych z Radomia – badania pilotażowe. Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 342-346
9. Brackowska B i wsp. Problemy zdrowotne młodzieży szesnastoletniej – uczniów szkół ogólnokształcących w Oświęcimiu. Probl Hig Epidemiol 2008, 89(3): 359-366
10. Mikołajczyk E. Jankowicz – Szymańska A. Wpływ otluszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7 latków. Fizjoterapia 2010; 18; 2; 10-20
11. Wilmańska I. Paradecka A. Raczkowski JW. Występowanie wad postawy ciała w młodszym wieku szkolnym. Fizjoterapia Polska 2015;15(4);64-73
12. Kurzyńska A. Popko J. Hassman – Poznańska E. Ocena narządu przedśionkowego u dzieci z idiopatycznym młodzieńczym skrzywieniem kręgosłupa. Otorinolaryngologia 2008; 7; 1: 29-34
13. Hantke A. Michnik R. Jurkojc J. Badania stabilograficzne gimnastyczek sportowych. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2012; 6: 37-42